

Pilzverzehr oder Verdacht auf Pilzvergiftung

Anamnese: Zeitpunkt, Menge, Lamellen- oder Röhrenpilze (Unterscheidung siehe unten), Zubereitungsdauer, Mitessende, Foto/Reste

Hauptsymptome



Gastrointestinale Symptome

Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, Bauchschmerzen



Neuro-/autonome Symptome

z.B. Halluzinationen, Schwitzen, Speichelfluss, Ataxie, Somnolenz



Hinweis auf Organtoxizität

Seltene Konstellationen mit Wiedererkennungswert

Violetter Urin

→ **Polyporsäure-Syndrom**

Flagellanten-Dermatitis
nach Shiitake

→ **Shiitake-Dermatitis**

Hämolyse nach
wiederholtem
Paxillus-Verzehr

→ **Paxillus-Syndrom**

Latenz bis Symptombeginn

<6 h

≥6 h

Nur GI-Beschwerden, keine Red Flags?


unter anderem:

- kein Mischpilzgericht
- keine Lamellenpilze gesammelt
- keine weiteren Symptome

Am ehesten gastrointestinales Reizsyndrom

Meist selbstlimitierend -
auch bei verdorbenen
oder unzureichend
gegarten Pilzen;
supportive Therapie,
Verlauf beobachten

**Hochrisikosituation
Amatoxin-Syndrom**
bis zum Ausschluss
annehmen;
entsprechendes
Management einleiten!



Andere DD z.B.

- Gyromitra-Syndrom
- Nephrotoxisches Amanita-Syndrom

Welches Muster passt am ehesten?

Halluzinationen,
Wahrnehmungsveränderungen
→ **Psilocybin-Syndrom**

Schwitzen, Speichelfluss,
Tränenfluss ±
Bradykardie / Miosis
→ **Muskarin-Syndrom**

Somnolenz, Ataxie,
Verwirrtheit, Agitation
→ **Ibotensäure-/Muscimol-Syndrom**

Flush, Schweißausbrüche,
Tachykardie nach Alkohol
→ **Coprinus-Syndrom**

Welches Muster passt am ehesten?


Hepatotoxizität nach
verzögerter GI-Symptomatik
→ **Amatoxin-Syndrom**
→ seltener **Gyromitra-Syndrom**

Akute Nierenschädigung nach
Stunden bis wenigen Tagen
→ **nephrotoxisches Amanita-Syndrom** erwägen

Akute Nierenschädigung
erst nach mehreren Tagen
→ **Orellanin-Syndrom** erwägen

Myalgien +
CK-Anstieg / Rhabdomyolyse
→ **myotoxisches Pilzsyndrom**


Weitere Infos:



ToxInfo.de




- **Kein klares Muster?** Mischintoxikation oder atypischer Verlauf möglich. Im Zweifel großzügig behandeln.
- Frühe GI-Symptome (<6 h) sind häufig *eher* harmlos - **späte GI-Symptome (≥6 h) immer eine Red Flag!**
- Aufgrund des breiten Spektrums und der potenziell schweren Verläufe **immer Expertenrat durch Giftnotruf und Pilzsachverständige** zu empfehlen!



Röhrenpilze



Blick von unten



Lamellenpilze